

## GUÍA DE SUPLEMENTOS PROGRAMA DE 14 DÍAS (SIDA/VIH)

**ATENCIÓN:** Las dosis recomendadas en este programa son sólo para pacientes con SIDA/VIH. Tras 2 semanas de suplementación reducir todas las dosis a la mitad o tomar a días alternos sin reducir la dosis. A partir de la tercera semana reducir nuevamente la dosis a la mitad, quedándose en ¼ parte de la dosis inicial. El trabajo dental, homeografías, protocolo con platos de zapeo e indicaciones dietéticas (antígenos específicos del SIDA) son parte de este programa y no debería empezarlo sin tenerlos en cuenta. No todos los detalles se mencionan en este documento. Para más información leer *The Cure for HIV and AIDS* (Ed. 2003). Siempre es recomendable que un testador Sincrómetro realice un seguimiento del paciente.

| PRODUCTO  | Antes desayuno   | Desayuno      | Mediodía         | Comida        | Media Tarde      | Cena          | Antes acostarse  |
|---|--|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Jarabe de hierbas de la Dra. Clark                      | ¼ cuch.  |               | ¼ cuch.          |               |                  |               |                  |
|   | Puede depositarse en cápsulas vacías con la ayuda de una pipeta si siente que es demasiado fuerte.                           |               |                  |               |                  |               |                  |
| HCL 5% (con las comidas)                                |  | 15 gotas      |                  | 15 gotas      |                  | 15 gotas      |                  |
| Yodo Lugol al 5%, antes de comer en ½ de vaso de agua   |  | 6 gotas       |                  |               | 6 gotas          | 6 gotas       | 6 gotas          |
|   | 6 gotas (10 si usa Lugol al 2%). No tomar si se es alérgico al yodo. Sustituir por 1 vaso de agua ozonizada 3 veces al día.  |               |                  |               |                  |               |                  |
| Hierro 10 mg (5 minutos antes de comer)                 |  | 1 cáp.        |                  | 1 cáp.        |                  | 1 cáp.        |                  |
| Vitamina B2 300 mg (5 minutos antes de comer)           |  | 2 cáps.       |                  | 2 cáps.       |                  | 2 cáps.       |                  |
| Óxido de Magnesio (5 minutos antes de comer)            |  | 2 cáps.       |                  | 2 cáps.       |                  | 2 cáps.       |                  |
| MSM (15 minutos antes de comer). Opcional.              |  | 1 cáp.        |                  |               |                  | 1 cáp.        |                  |
| Coenzima Q10 400 mg                                     | 10 cáps.   |               |                  |               |                  |               |                  |
| Pau d'Arco (té)   |  |               |                  |               | 1 taza de te     |               |                  |
| Selenio   |  | 5 cáps.       |                  | 5 cáps.       |                  | 5 cáps.       |                  |
| Hortensia molida (germanio orgánico)                    |  | 1 cucharadita |                  | 1 cucharadita |                  | 1 cucharadita |                  |
|   | Se puede aumentar conforme avanza el programa.   |               |                  |               |                  |               |                  |
| Vitamina C  |  | 1000 mg       |                  | 1000 mg       |                  | 1000 mg       |                  |
| Escaramujo (aporta partes orgánicas vitamina C)         |  | 1 cáp.        |                  | 1 cáp.        |                  | 1 cáp.        |                  |
| L-G   | 1 cucharada sop.   |               | 1 cucharada sop. |               | 1 cucharada sop. |               | 1 cucharada sop. |
| L-A   | 1 cucharadita  |               | 1 cucharadita    |               | 1 cucharadita    |               | 1 cucharadita    |
| Decaris (Levamisol) 50 mg                               |  | 2 comprimidos |                  | 2 comprimidos |                  | 2 comprimidos |                  |
|   | Decaris (marca de Levamisol en Méjico). Utilizar el medicamento, la homeografía o suplementos alternativos: Berro o Papaina. |               |                  |               |                  |               |                  |
| Enzimas Digestivas (pedir fórmula <b>sin</b> bromelina) |  |               | 15 cáps.         |               | 15 cáps.         |               |                  |
| Aceite de oliva ozonizado (testado)                     |  |               | 1 cucharada sop. |               | 1 cucharada sop. |               |                  |

| <b>HOMEOGRAFÍAS</b>   | Ver programa y homeografías que se necesitan, aquí.   |          |          |         |             |         |                 |
|---|---|----------|----------|---------|-------------|---------|-----------------|
|   | Antes desayuno  | Desayuno | Mediodía | Comida  | Media Tarde | Cena    | Antes acostarse |
| Limpieza renal  | Al terminar las gotas para los riñones seguir una limpieza renal completa.  |          |          |         |             |         |                 |
| Glutation 500 mg (15 minutos antes de comer)  |   | 2 cáps.  |          | 2 cáps. |             | 2 cáps. |                 |
| Betaina HCL 300 mg  |   | 3 cáps.  |          | 3 cáps. |             | 3 cáps. |                 |
|   | Sólo durante 3 días cuando empiece el Trabajo Dental.   |          |          |         |             |         |                 |
| Vitamina A  | 100.000 IU  |          |          |         |             |         |                 |
| Nopal (cactus)  | 6 cáps.   |          |          |         |             |         |                 |
| L-Cisteína  |   | 2 cáps.  |          | 2 cáps. |             | 2 cáps. |                 |
| Suplemento para priones (síntomas gripe)  |   |          | ½ taza   |         | ½ taza      |         |                 |
| Ácido Glucurónico 250 mg  |   |          | 1 taza   |         | 1 taza      |         |                 |
| Ácido Tióctico 250 mg (no tomar con líquido caliente)   | 3 cáps.   |          |          |         |             |         |                 |
| Taurina 500 mg  | 3 cáps.   |          |          |         |             |         |                 |
| Zinc 30 mg  |   | 1 cáp.   |          |         |             |         |                 |
| <b>PROGRAMA DESPARASITANTE</b>  |   |          |          |         |             |         |                 |
| Receta semillas frescas de albaricoque  | No forma parte del programa original pero es útil para eliminar el parásito de la malaria y más. Más detalles aquí.               |          |          |         |             |         |                 |
| Tintura de Nogal Negro Extra Fuerte   | 2 cucharadas  |          |          |         |             |         |                 |
| Ajenjo  | 7 cáps.   |          |          |         |             |         |                 |
| Clavo   | 7 cáps.   |          |          |         |             |         |                 |
| <b>PULSADOR MAGNÉTICO</b>   | Los campos magnéticos son útiles para varias finalidades (este aparato puede sustituir los imanes que usaba la Dra. Hulda Clark). |          |          |         |             |         |                 |
| <b>GUÍA DE ZAPEO</b>  | Caja de platos conectada en paralelo, consulte programa en el libro.  |          |          |         |             |         |                 |
| <p>El programa se repite 2 semanas más como se describe arriba. Más allá del tiempo indicado, la seguridad de estos productos, a estas dosis, no ha sido comprobada.</p> <p>Suplementos que pueden incluirse: Oscilococcinum 1 tubo antes de irse a la cama para síntomas de la gripe.</p> <p>Todos los productos excepto las homeografías tienen que congelarse a -29°C durante un mínimo de 24 horas. Traspasar jarabe y Lugol a envases de HDPE antes de congelar.</p> |   |          |          |         |             |         |                 |